

Органічний інсектицид контактно-кишкової дії для захисту сільськогосподарських та овочевих культур від лускокрилих шкідників

Діюча речовина

Комплекс природних емаектинів, що продукуються корисним ґрунтовим мікроорганізмом *Streptomyces avermitilis* штаму LZ-17-5 (не менше 1,4%).



Препаративна форма

Рідина.



Упаковка

1 л, 5 л, 20 л – каністра.



Умови зберігання

Зберігати за t° від +2 °C до +25 °C, в сухому, захищеному від прямих сонячних променів місці.



Термін придатності

24 місяці.



КУЛЬТУРА	НАЗВА ШКІДНИКА	НОРМА ВИТРАТИ ПРЕПАРАТУ	НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ
Зернові: пшениця, ячмінь, жито	Звичайна зернова совка (гусінь II-III віку), трипси	0,15-0,4 л (кг)/га	200 - 300 л/га
Хрестоцвіті (ріпак, гірчиця, капуста)	Капустяна совка, білан капустяний, ріпаковий білан, капустяна міль	0,15-0,3 л (кг)/га	200 - 300 л/га
Бобові	Совки, плодожерка горохова, брухус	0,15-0,3 л (кг)/га	200 - 300 л/га
	Чортополохівка	0,6-0,8 л (кг)/га	200 - 300 л/га
Кукурудза	Лучний метелик, стебловий кукурудзяний метелик, совки	0,15-0,4 л (кг)/га	200 - 300 л/га
Овочі закритого та відкритого ґрунту	Бавовникова совка, листогризучі совки, молі, мінери	0,2-0,4 л (кг)/га	400 - 800 л/га
Плодово-ягідні культури	Листокрутки, плодожерки, п'ядуни, совки, гусінь американського білого метелика	0,4-0,8 л (кг)/га	800 - 1000 л/га
Соняшник	Соняшникова вогнівка, бавовникова совка	0,3-0,4 л (кг)/га	200 - 300 л/га

ВИГОДИ ВІД ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТУ

- Швидка дія проти приховано та відкрито живучих лускокрилих шкідників (совки, молі, листовійки, п'ядуни, білани та інші.).
- Має побічну ефективну дію проти попелиці, кліщів, трипсів, квіткоїда та ін.
- Надійна дія за різних умов застосування.
- Проявляє контактну та додатково кишкову дію.
- Не накопичується у продукції.

МЕХАНІЗМ ДІЇ

Після обробки препарат швидко проникає у тканини рослин (впродовж 2-3 годин), але не має системної дії. Завдяки швидкому проникненню у рослини ефективність дії препарату не залежить від високих температур та опадів. Локалізація препарату всередині рослинних тканин забезпечує захисний період – до 2 тижнів. Через 4-5 годин після застосування шкідники перестають житись, масова загибель шкідників відмічається на 2 добу,

максимальний ефект від застосування препарату відмічають на 3-5 добу. Завдяки проникненню в рослину проявляє високу активність проти приховано живучих шкідників – мінерів та мінуючих молей. Дія препарату починається з фази яйця – пряма овідна дія.

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ

- Обов'язково застосовувати таку кількість робочого розчину, яка забезпечить якісне та рясне змочування поверхні рослин.
- pH робочого розчину в межах 5,5 – 7,0.
- Обробку проводити в ранковий або вечірній час, або впродовж дня за умов хмарності в суху безвітряну погоду.
- Температурний режим від +15 до +30°C.
- Термін ізоляції бджіл – 24 години (для мінімізації негативного впливу на бджіл рекомендується проводити вечірні обробки в період після припинення їх льоту).
- Термін очікування після обробки препаратом до збору врожаю – 10 діб.